



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 18 du 6 juin 2001 - 2 pages - Numéro ordre postal : 40

Blé

STADES : épiaison / début floraison à fin floraison / grain présent.

Maladies

Par rapport à la semaine dernière, peu d'évolution mis à part parfois le développement de pustules de rouille brune sur les variétés sensibles (ISENGRAIN, SOISSONS...).

Les pluies annoncées, si elles sont suffisantes, peuvent relancer le risque fusariose sur les parcelles en cours de floraison. Situations présentant le plus de risques : les précédents maïs, surtout en non labour. Le type de fusariose (*Fusarium roseum* ou *Microdochium nivale*) dépend des températures (*roseum* si températures élevées, *nivale* si températures fraîches). Pour la lutte, revoir la fiche fusariose du mois d'avril :

triazoles (tebuconazole, metconazole) contre *roseum*, azoxystrobine ou éventuellement prochloraz contre *nivale*. Les associations tebuconazole + azoxystrobine assurent aussi une très bonne protection rouille brune.

Pucerons

La situation a quelque peu évolué depuis la semaine dernière. Sur 38 parcelles observées, des pucerons sont présents sur épis dans la moitié des situations (contre 1 sur 4 il y a une semaine). Les niveaux d'attaque sont variables. Exemples :

10% d'épis avec pucerons à Jaulnes(77), Jouy le Châtel(77), Saint Jean de Beauregard(91), Ablis(78),

30% d'épis avec pucerons à Château Landon, Larchant et Amponville (77), Janvry(91),

40% d'épis avec pucerons à Guillerval et Méréville(91), Fontaine le port(77), Passy/Seine(77),

70% d'épis avec pucerons à Episy(77).

Le plus souvent, il n'y a qu'un puceron sur épi (bien regarder entre les épillets).

De nombreuses parcelles approchent donc du seuil d'intervention d'un épi sur 2 colonisé. Intervenez dès que possible dans ces cas. Plus les populations augmenteront sur épis, plus elles seront difficiles à contrôler.

Produits : pyrèthres seules ou associées.

Orge printemps

STADES : épiaison pour les semis de février, F1 pointante ou dégagée pour ceux de mars-avril.

Maladies

Peu d'évolution. La rhynchosporiose reste le plus souvent sur les F5 voire F4, pour les parcelles de la deuxième vague de semis. Idem pour la rouille naine.

Sur les parcelles n'ayant reçu aucun traitement, un fongicide peut être appliqué.

Pois

STADES : 3 étages de gousses pour les semis de février, boutons à 2 étages de fleurs pour ceux de mars-avril.

Maladies

En absence de pluies, l'anthracnose n'a pas évolué et reste présente sur les étages foliaires inférieurs.

Les pluies possibles peuvent relancer le développement de l'anthracnose. Une intervention pourra s'envisager :

- sur les parcelles en pleine floraison, n'ayant reçu aucune protection,

- sur les parcelles arrivant en début floraison.

Ravageurs

Les populations de pucerons restent globalement limitées (0 à 3 pucerons / plante). Toutefois certaines parcelles présentent des infestations beaucoup plus élevées. Exemples :

Janvry(91) 10-30 pucerons / plante.

Neauphle le vieux(78) 20-60 pucerons / plante.

Une intervention doit être envisagée en cas de forte pullulation, surtout sur les parcelles en début floraison.

Les captures de tordeuses ont été relativement limitées cette semaine (le plus souvent

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 370 F
Fax 435 F

Blé
Féverole
Pucerons

40
50- 48 744 30

P18

moins de 20 captures). Deux sites présentent des captures élevées : Passy / Seine (77) et Morigny Champigny (91). Voir carte des cumuls.

Féverole

STADES : 1 à 2 étages de gousses pour les semis de février, 1 à 3 étages de fleurs pour ceux de mars-avril.

Ravageurs

Les pucerons noirs de la fève restent fortement présents dans certaines parcelles (indépendamment du stade).

Exemples de nbre de pucerons / plante (témoins non traités):

Choisy en Brie (77)..... 15,
Chaumes en Brie (77)..... 20,
Doue (77)..... 30,
Les Ulis (91)..... 30,
Jouy le Châtel (77)..... 50.

Si cela n'a pas été encore effectué, intervenez rapidement contre les pucerons.

Maladies

Pas d'évolution depuis la semaine dernière.

Comme pour le pois, les maladies pourraient être relancées en cas de passages pluvieux.

Betteraves

STADES : 5 à 12 feuilles. Développement rapide de la végétation.

Ravageurs

Des pucerons s'observent en parcelles. Exemples : Pécy (77), Fouju (77), Auvernaux (91), Roinvilliers (91).....

Les parcelles non protégées au semis avec GAUCHO - TEMIK - DACAMOX ou CARDINAL doivent déjà être sous protection.

Une intervention est à envisager sur les semis d'avril (sauf GAUCHO).

Maïs

STADES : 2 à 6 feuilles

Ravageurs

Quelques pucerons sont parfois présents : 1 pour 10 plantes à 1 par plante maximum. Ces niveaux sont inférieurs aux seuils d'intervention.

Nous mettons en place cette semaine notre réseau de piégeage de la pyrale. Pour les observateurs, n'oubliez pas de conserver les capsules au frigo.

Tournesol

STADES : 2 à 4 paires de feuilles.

Pucerons

Présence de pucerons. Exemples : Fretoy (77) moins de 5 pucerons / plante, Roinvilliers (91) 30 pucerons / plante.

Rappel du seuil d'intervention : 30-50 pucerons / plante.




PLATE-FORMES

Le SRPV Ile de France sera présent :

- à la plate-forme SUD Ile de France le 7 juin à Boutigny / Essonne (91)
- à la plate-forme CORIOLIS le 12 juin à Guignes (77)

N'hésitez pas à venir nous poser vos questions.